

## המלצות ראשוניות למתן חיסון נגד קוביד-19 בחולים הסובלים ממחלות ראומטיות

### דלקתיות

1. הסיכון לחלות בקוביד-19 בקרב חולים עם מחלות ראומטיות דלקתיות הינו דומה או מעט מוגבר לעומת האוכלוסייה הכללית.
2. חומרת מחלת הקוביד-19 בקרב חולים עם מחלות ראומטיות דלקתיות מוכתבת בראש וראשונה על ידי גורמי סיכון קרדיוסקוליים המקובלים באוכלוסייה הכללית, כגון גיל מעל 60, עודף משקל, סכרת, יתר לחץ דם, אי-ספיקת כליות ואסטמה.
3. לאור הפנדמיה ושיעורי הדבקה גבוהים, בשלב זה משרד הבריאות ממליץ על חיסון לקוביד 19 מסוג mRNA של חברת פייזר לאוכלוסיות מעל גיל 16 עם גורמי הסיכון המצוינים בסעיף 2, כולל חולים עם מחלות ראומטיות דלקתיות המטופלים בתכשירים מדכאי חיסון.
4. החיסון אינו כולל נגיפים או חלקי נגיפים ועל כן אינו יכול לגרום למחלת קוביד-19.
5. אין מידע על היעילות והבטיחות של החיסון לקוביד 19 באוכלוסית מדוכאי החיסון. יחד עם זאת, המומחים מניחים כי התגובה תהיה דומה לנצפית עבור חיסונים מומתים אחרים, כגון שפעת, ועל כן אנו צופים שרוב החולים עם מחלות ראומטיות דלקתיות יפתחו תגובה חיסונית מספקת בדומה לאוכלוסייה הכללית ועם פרופיל תופעות לוואי דומה.
6. חולים המטופלים בפרדניזון במינון העולה על 10 מ"ג ליום או חולים המטופלים במבתרה מתבקשים להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי מועד החיסון.
7. חולים הסובלים מזאבת שאינה יציבה מתבקשים להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת החיסון.
8. כל עוד אין מידע נוסף על היעילות של החיסון, יש להמשיך להקפיד על עטית מסכה ושמירה על ריחוק חברתי.

חברי הועדה לחיסוני COVID-19 בחולים הסובלים ממחלות ראומטיות דלקתיות: פרופ' אורי אלקיים, ד"ר ויקה פורר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' דפנה פארן

וועד האיגוד הישראלי לרומטולוגיה